LA LACTOSA ES EL AZÚCAR QUE SE ENCUENTRA DE MANERA NATURAL EN LOS LÁCTEOS

Leche
normal

12 g de lactosa
(1 vaso - 8 oz - 250 mL)

Yogur
normal

5 g de lactosa
(4,4 oz - 125 g)

Quesos duros
bajos en grasa,
como el Cheddar

trazas de lactosa
(.16 oz - 45 g)

LA LACTASA, UNA ENZIMA, DESCOMPONE NORMALMENTE LA LACTOSA EN 2 AZÚCARES: GLUCOSA Y GALACTOSA

LA MALA DIGESTIÓN DE LACTOSA ES LA DIFICULTAD PARA DIGERIR LA LACTOSA

LA MALA DIGESTIÓN DE LA LACTOSA SE DEBE A LA REDUCCIÓN NORMAL DE LA ACTIVIDAD/CANTIDAD DE LACTASA

LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA ES LA MALA DIGESTIÓN DE LA LACTOSA QUE PROVOCA SÍNTOMAS

LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA AFECTA A MUY POCAS PERSONAS

¿CÓMO SABER CON SEGURIDAD SI SE ES INTOLERANTE A LA LACTOSA?

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU MÉDICO; EL DIAGNÓSTICO SOLO PUEDE EFECTUARSE BAJO CONTROL MÉDICO, MEDIANTE LA PRUEBA DE HIDRÓGENO EN EL ALIENTO



CUIDADO CON EL AUTODIAGNÓSTICO

1 ¡MÁS DEL **50%** SON FALSOS!

El autodiagnóstico se asocia con más síntomas y con una peor percepción de la calidad de vida

2 Estos síntomas no son específicos de la intolerancia a la lactosa

Factores psicológicos
(ansiedad somática, estrés y depresión)

Problemas digestivos
(enfermedad de Crohn colitis ulcerosa)

Flatulencia
Diarrea
Hinchazón

3 Intolerancia a la lactosa ≠ Alergia a la proteína de la leche de vaca

NO ES NECESARIO EVITAR LOS LÁCTEOS

SIMPLEMENTE ADAPTE SUS HÁBITOS ALIMENTICIOS

Evitar los excesos es una regla de oro que también es aplicable para los malos digestores e intolerantes a la lactosa

Las bacterias vivas del yogur ayudan a digerir la lactosa

Los quesos duros contienen poca o nada de lactosa
como cheddar, provolone, mozzarella, etc.

Consuma alimentos que contengan lactosa en pequeñas cantidades a lo largo del día

CONFIRMADO POR LA EFSA: EL YOGUR MEJORA LA DIGESTIÓN DE LA LACTOSA

OTRAS ORGANIZACIONES MÉDICAS (NMA*, NIH*, FAO*...) RECOMIENDAN QUE LOS MALOS DIGESTORES Y LOS INTOLERANTES A LA LACTOSA CONSUMAN YOGUR

La WGO* ha emitido una declaración similar, recomendando el consumo de productos lácteos fermentados que contengan probióticos, con beneficios probados para la salud digestiva.

*NMA (Asociación Médica Nacional), NIH (los Institutos Nacionales de Salud, encuadrados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos), EFSA (la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria), WGO (la Organización Mundial de Gastroenterología) y FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).

EL YOGUR TAMBIÉN ES UN ALIMENTO RICO EN NUTRIENTES

- Calcio
- Proteínas de alta calidad
- Vitaminas + Minerales
- Ácidos linoleicos conjugados
- 10⁸ bacterias vivas con lactasa por g de yogur

- Ayuda a fortalecer los huesos y los dientes
- Ayudan a construir y reparar los músculos
- Esenciales para el funcionamiento del cuerpo
- Estimulan el sistema inmunológico y tienen propiedades anticancerígenas
- Mejora la digestión de la lactosa contenida en el yogur

El yogur es un **alimento conveniente para todos** y es una **buena alternativa para mantener una dieta equilibrada.**

Referencias:
Adolfsson O and al., Yogurt and gut function. Am J Clin Nutr 2004;80:245-56.
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (France). Avis relatif à l'évaluation de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un aliment destiné à des fins médicales spéciales. Saisine n° 2014-SA-0188. Maisons-Alfort, 2 décembre 2015. Disponible à l'adresse suivante : https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014SA0188.pdf
Codex Alimentarius. 2003. Codex standard for fermented milks. CODEX STAN 243-2003. Rev.
Corrigendum to "Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to live yoghurt cultures and improved lactose digestion" [EFSA Journal 2010;8(10):1763] Pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010;8(12):1763
Corrigendum to "Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to live yoghurt cultures and improved lactose digestion" [EFSA Journal 2010;8(10):1763] Pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010;8(12):1763
Guarner F and al., Probiotics and prebiotics. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines 2008;8(4):293
Hermans M and al., Lactose malabsorption and intolerance: implications for food industry. Lebensm Wiss Technol 1997;30:339-47
Hertzler S.R. and al., Yogurt components do not explain food label differences in the lactose challenge test. J Am Diet Assoc 2003;103:582-7
Nicklas TA and al., Self-perceived lactose intolerance results in lower intakes of calcium and dairy foods and is associated with hypertension and diabetes in adults. Am J Clin Nutr 2010;91:94-9
Pedersen A and al., Constipating factors in milk. Am J Clin Nutr 2007;85:1018-23
Scarlett JL and al., A comparison of symptoms after the consumption of milk or lactose-hydrolyzed milk by people with self-reported severe lactose intolerance. N Engl J Med 1981;305:1-4
Shah NP and al., Effect of milk-based beverages containing live yogurt bacteria and fructooligosaccharides on lactose digestion. J Dairy Sci 2007;90:3179-92
Sollaggi A. Adult lactose digestion status and effects on disease. Can J Gastroenterol Hepatol 2015;29:346-52
Vesa TH and al., Intestinal transit and symptoms in healthy subjects with lactose maldigestion and lactose load. Nutr Res 2000;20:1269-78
WGO & Chinese GI Society. Probiotics and prebiotics in the practice of the Chinese GI and Nutrition Societies. Nutrition Advocacy Group 2011;1:1-8
Wikipedia. Lactase persistence. https://en.wikipedia.org/wiki/Lactase_persistence#/media/File:Lactase_persistence_world_map.png
Yang CM, Global Food Allergy Report. May 30, 2012.
Wingfield LA, Cook RM, Alleyne GO. Constipated children and malabsorption. Am J Clin Nutr 1974;27:1351-5.

YOGURT NUTRITION
INITIATIVE FOR A BALANCED DIET

WGO